

AVERTISSEMENTS AGRICOLES[®]

REGION CENTRE

www.srpv-centre.com

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES



Grandes Cultures

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA PÊCHE

D.R.A.F. CENTRE
Service Régional de la
Protection des Végétaux
93, rue de Curambourg
45404 Fleury les Aubrais
Tél. 02.38.22.11.11
Fax 02.38.84.19.79
SRPV.DRAF-CENTRE@
agriculture.gouv.fr

Imprimé à la Station
d'Avertissements agrico-
les de la Région CENTRE
La Directrice-Gérante :
M. HANRION
Publication périodique
C.P.A.P. n° 80530
ISSN n° 0757-4029

Diffusion en collabora-
tion avec la FREDEC
CENTRE (Art L252-1 à
L252-5 du Code Rural)

Pois

Stade : remplissage des derniers étages

Ravageurs

Les captures de **tordeuses** ont été très importantes ces derniers jours dans la plupart des secteurs.

- Pois protéagineux : dans la plupart des secteurs concernés, les seuils étaient déjà atteints la semaine dernière, et les traitements ont dus être réalisés récemment.

Les parcelles ont maintenant, sauf cas très exceptionnel, dépassé le stade sensible. Ne plus intervenir.

- Pois de semence : renouveler l'intervention si le dernier traitement est en fin de persistance d'action, et si les pois sont encore à un stade sensible.

Maladies

L'**anthracnose** a été bien maîtrisée. On observe un peu de **botrytis**, et quelques nouveaux symptômes de **mildiou**, et parfois quelques taches de **sclérotinia**.

Maïs

Stade : "9 à 13 feuilles".

Ravageurs

Pyrale

Le vol a débuté dans de nouveaux secteurs :

- 14/06 : Nouan/Loire (41) ;
- 18/06 : Baccon (45) ;
- du 19/06 au 23/06 : Civray (18), Diors (36), Averdon (41), Germignonville, Moléans (28), Férolles, Villamblain (45) ;
- depuis le 24/06 : Séris, Ambloy (41), Ecublé (28), Tavers (45).

Toujours pas de capture à Vou (37), St Maur (36), La Bazoches Gouët, Crécycouvé, Nogent le Roi (28), Charsonville (45).

Des pontes fraîches sont maintenant observées dans plusieurs secteurs :

- Richelais (Brizay -37-) le 21/06 ;
- Ste Maure le 24/06 (Noyant de Touraine -37-) ; des pontes plus avancées y sont aussi observées ;
- Gâtines de Loches-Montrésor le 24/06 (Chambourg -37-) ;

- Vallée et coteaux de la Loire le 19/06 (St Claude de Diray, Maslives, Courbouzon -41-) ;

- Sologne le 20/6 (Lailly en Val -45-) ;

- Beauce entre le 20 et le 25/06 (Lestieu, Mulsans, Villerbon, Suèvres, Villerable -41-) ;

- Gâtinais ouest le 24/06 (Lorcy -45-).

Rappel : l'importance des captures sur pièges à phéromones, dans le cas des pyrales, n'est pas représentatif de l'infestation au champ. Le piège est indispensable pour détecter le début du vol et informer sur leur activité.

Pour **estimer l'importance du risque**, il faut combiner plusieurs informations :

*infestations larvaires à l'automne précédent ;

*choix des pratiques culturales : défavorables à la survie des pyrales (broyage des résidus à l'automne, labour) ou favorables (résidus non broyés et non enfouis), fréquence de la culture du maïs ;

*attractivité des parcelles par rapport aux parcelles voisines ;

*suivi des pontes (observations régulières sur 5 x 10 plantes ; seuil : 10 % de plantes avec pontes).

Dans les parcelles à risque, la date de l'intervention insecticide dépend de la précocité des vols :

- Secteurs précoces, où le vol a débuté fin mai-tout début juin : intervention à prévoir en début de semaine prochaine.

- Début de vol vers le 10 juin : intervention vers le 7 juillet.

- Secteurs plus tardifs : intervention mi-juillet.

Pucerons : ils sont rares, et les auxiliaires actifs.

Cicadelles : nombreuses dans plusieurs parcelles.

Tournesol

Stade : "bouton étoilé" à "début floraison"

Phomopsis

Premiers symptômes observés (Chaveignes -37-).

De nouvelles contaminations sont possibles seulement en cas de pluie.

Les parcelles les plus à risque (variétés oléiques) ont du être protégées.

Maïs

Pyrales : des pontes sont observées

Pois

Tordeuses : vol important mais la majorité des parcelles ne sont plus à un stade sensible

Betterave

Noctuelles : infestations variables

Betterave

Stade : couverture du sol.

Ravageurs

Des larves de **noctuelles** sont observées dans plusieurs parcelles ; les infestations sont très variables.

Vérifier l'importance des populations au champ.

Pour info

- **Colza** : des attaques de phoma ou de sclérotinia sont observés dans certaines parcelles ;

Symptômes

***phoma** : nécrose au collet,

***sclérotinia** : manchon blanc autour des tiges.

Le CETIOM réalise une enquête sur l'importance des attaques de phoma ; il serait intéressant d'y répondre, si vous constatez des attaques, mais aussi si vos parcelles sont saines. Il est très important d'avoir des informations aussi sur les parcelles saines, afin d'éviter de surévaluer l'importance des attaques, et aussi de trouver des critères discriminants entre les parcelles attaquées et les autres.

Questionnaire disponible au CETIOM, SRPV, chambres d'agriculture.

Suivi du vol des Tordeuses du pois

ép	Lieu	Cumul
18	Champagne Berrichonne	
	St Florent / Cher	829*
	St Germain du Puy	228*
	St Michel de Volangis	137*
28	Faux Perche	
	Arrou	356
	Boisgasson	198
	Vieuvicq	52
	Combres	534
	Beauce	
	Germignonville	468
	Ormo	841
	Chartainvilliers	1031
	Pierres	892
	Neron	844
	Bouglainval	977
	Neuvy en Dunois	335
	Moriers	583
	Champseru	572
	Sours	415
	Orrouer	136
	Drouais Thymerais	
	Montigny/Avre	432
	Prudemanche	245

* : cumul non mis à jour depuis la semaine dernière

Dépt	Lieu	Cumul
45	Gâtinais	
	St Loup de Gonois	49
	St Hilaire les Andresis	179
	Mérinville	38*
	Lorris	64
	Beauce	
	Rouvres St Jean	461
	Bougy les Neuville	399*
	Bazoche les Gallerandes	289*
	Charsonville	185
41	Beauce	
	St Laurent des Bois	523
	St Leonard en Beauce	137
	Villerbon	162
	Villermain	600
	Grande Sologne	
	Souigny en Sologne	95
	Perche	
	Bouffry	180
	Plateaux bocagers de la Touraine M.	
36	Champagne Berrichonne	
	Fontenay	293
	Boischaut Nord	
	Bouges Le Château	304*
	Boischaut Sud	
	Vicq Exemple	698
	Gâtines Tourangelle	
	St Martin des Bois	495
	Pontlevoy	
	Pontlevoy	35